

# Avertissements agricoles



Bulletin n° 26 do 05 octobre 1988

Numérotation continue : n° 78

**COLZA :**

- . Altises : traitement inutile
- . Charançon du bourgeon terminal : surveiller son apparition
- . Fiche ravageurs

**CEREALES :**

- . Pucerons : attendre et surveiller
- . Limaces : rester vigilant
- . Desherbage de post-levée précoce

**COLZA :**

Les colzas sont au stade 4-5 feuilles dans la majorité des cas, au stade cotylédons-1 feuille dans certaines parcelles resemées.


**- Altises :**

Les captures restent faibles. Le seuil de traitement est rarement atteint.

Dans les parcelles semées tardivement, continuer les observations jusqu'au stade 3 feuilles.

**- Charançon du bourgeon terminal :**

Le vol n'a pas encore démarré, il est trop tôt pour intervenir.



. Dégâts : l'adulte pond dans le pétiole. Les larves remontent au cœur de la plante et détruisent le bourgeon terminal.

Au printemps, les pieds prennent un aspect buissonnant.

. Préconisations : Rester vigilant. Poser les cuvettes à 25 cm du sol et surveiller son apparition.

**CEREALES :**

Les premières orges semées commencent à lever et sont au stade 1 feuille.

**- Pucerons :**

Susceptibles de transmettre le virus de la jaunisse nanisante de l'orge, les pucerons seront à éliminer dès que leur présence sera constatée sur plus de 1 pied sur 5. **Attention**, l'obser-



vation doit s'effectuer sur au minimum 100 plantules en examinant soigneusement le collet et l'intérieur du cornet de la dernière feuille sortie. Choisir de préférence une période chaude de la journée.

Orge et blé sont sensibles à ce virus. Les parcelles les plus exposées sont celles qui ont été semées très tôt (généralement avant le 20 septembre) et qui sont entourées de maïs porteurs de pucerons infectés ou envahies de repousses d'orges également contaminées (champs de colza par exemple).

A l'heure actuelle, il est inutile d'intervenir. Les premières observations montrent l'absence de pucerons dans les parcelles d'orge et une faible infestation des repousses.

- Limaces :

Continuer à surveiller leur présence même si un traitement a été effectué soit avec la semence, soit après le semis.

- Desherbage post-levée précoce :

Il vise en priorité les graminées, mais contrôle de plus en plus un certain nombre de dicotylédones. Il s'impose sur des semis précoces non desherbés en pré-levée permettant en outre :

- \* d'éliminer très tôt la concurrence vis à vis de la céréale
- \* de s'affranchir des conditions de sol (sec ou motteux)
- \* de contrôler un vulpin jeune, donc plus vulnérable
- \* de n'être encore pas trop tributaire des conditions climatiques défavorables (écarts importants de températures, pluies abondantes...).

Pour le choix des produits, on se reportera au dépliant vert ITCF-SPV. Parmi les nouveautés 1988, outre le QUARTZ GT déjà cité en pré-levée, est également utilisable en post-levée :

\* PUMA, de la société PROCIDA à base de fenoxaprop-éthyl, utilisable sur blé tendre à la dose de 3 l/ha du stade 2 à 3 feuilles à fin tallage des adventices et des stades 1 feuille à 2 noeuds de la céréale.

Cet anti-graminée très efficace sur vulpin et folle avoine levés (absorption uniquement foliaire) est également actif sur agrostides, avoine à chapelet et paturin. Il peut être utilisé à l'automne et au printemps ; on évitera cependant les périodes trop froides ou à écarts de températures importants.

- Réduction de doses :

Les pesticides, avant d'être autorisés à la vente ou homologués, sont testés à des doses optimum pour donner satisfaction dans un maximum de situations. Les doses d'homologation figurant sur les emballages correspondent donc à celles effectivement approuvées qui seront seules préconisées par notre service.

Nous mettons en garde les agriculteurs attirés par les techniques de réduction de doses de matière active car les résultats très hétérogènes enregistrés jusqu'alors sont difficilement transposables et la plus grande prudence s'impose dans ce domaine.

\*\*\*\*\*


**Fiche RAVAGEURS DU COLZA :**

Noter que jusqu'au 31.12.88, les spécialités insecticides autorisées sur charançon de la tige peuvent être appliquées sur le charançon du bourgeon terminal (catégorie assimilée).



# RAVAGEURS DU COLZA

Cherchez-les au bon moment...



Dessins de A. GRAVAUD (Service de la Protection des Végétaux).


... avec la bonne méthode...

## Le piégeage ou technique de la cuvette jaune

- **Mise en place des cuvettes** : dès le semis, ou au plus tard à la levée, dès les premiers réchauffements, les installer à 10 mètres de la bordure, du côté d'un ancien champ de colza; les remplir avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle.

Jusqu'au stade B2, la cuvette est enterrée, puis elle est placée à 25 cm de hauteur.

**Attention !** Le fond de la cuvette doit suivre le niveau supérieur de la végétation.



- **Surveillance** : 2 fois par semaine et tous les jours après les premières captures.
- **Insectes capturés** : grosse altise, charançon du bourgeon terminal, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

## L'observation des plantes

- **Observez 50 plantes** au hasard sur l'ensemble de la parcelle.
- **Insectes** : grosse altise (larve et adulte), puceron cendré du chou, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

... et comptez-les



# Quand faut-il traiter ?

Ravageur	Observation des plantes	Piégeage "cuvette jaune"
Limace	dès les premiers dégâts, du semis au stade B2	
Grosse altise adulte	3 pieds/10 avec morsures nutritionnelles, jusqu'au stade B2	20 à 30 captures cumulées après le stade B2
Grosse altise larve	2 plantes/3 attaquées	
Puceron cendré	— automne 1 plante/5 colonisée — de C1 à 3-4 semaines avant la récolte : 2 colonies/m <sup>2</sup>	
Charançon du bourgeon terminal		notez les premières captures : intervenez 10 à 15 jours après si le colza est au stade B3
Gros charançon de la tige		après les premières captures, intervenez en tout début d'intensification du vol (stades C1 à T20)
Meligèthe	— stades boutons accolés à D1 : 1 insecte par inflorescence — stades boutons séparés à E : 2 ou 3 insectes	vous indique les premières arrivées vous pouvez alors aller observer
Charançon des siliques	à partir des stades G2 G3 : 1 charançon pour 2 pl.	

## Les produits de traitement

### • Contre les limaces

- appâts empoisonnés sous forme granulée, épandre régulièrement le soir (25 granulés par m<sup>2</sup>)
- matières actives : mercaptodiméthur (3 à 5 kg/ha selon les spécialités commerciales)  
métaldéhyde (5 à 10 kg/ha selon les spécialités commerciales)

### • Contre les insectes

Au semis		De la levée à la fin du repos hivernal		Produits utilisables (1)		A partir de la reprise de végétation			
Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Matières actives	Spécialités commerciales	Charançon de la tige	Meligèthe	Charançon des siliques	Puceron
9 kg				Benfuracarbe	Oncol 5 G				
9 kg	9 kg			Carbofuran	Nombreuses spécialités (2)				
12 kg	12 kg			Furathiocarbe	Deltanet				
10 kg				Terbuphos	Counter plus				
9 kg				Thiofanox	Dacamox 5 G - Dacamox 5 S				
18 kg				Phorate + Terbuphos	Dispell				
		0,15 l		Alphaméthrine	Fastac	0,15 l	0,2 l	0,2 l	
		0,07 l		Biphenthrine	Talstar	0,07 l	0,1 l	0,1 l	
				Bromophos	Nexion 25 - Sovinexion 25 Nexion 40 - Nexion EC 40		2 l 1,4 l	2 l	2 l
		0,3 l	0,3 l	Cyfluthrine	Baythroid	0,3 l	0,2 l	0,2 l	
		0,25 l 25 g ma/ha		Cyperméthrine	Cymbush, Kafil super Nombreuses spécialités (2)	0,25 l	0,25 l 20 g ma/ha	0,25 l	
		0,2 l		Deltaméthrine	Décis CE - Décis RU Décis Flo	0,3 l 0,3 l	0,2 l 0,2 l	0,2 l	
				Dialiphos	Torak		1,25 l	1,25 l	
		250 g ma/ha		Endosulfan	Nombreuses spécialités (2)	400 g ma/ha	250 g ma/ha	600 g ma/ha	
		0,6 l		Esfenvalérate	Sumi alfa		0,5 l		
		0,5 l		Fenvalérate	Sumicidin 10		0,4	0,4 l	
		0,2 l		Fluvalinate	Mavrik		0,2 l		0,2 l
		0,15 l		Lambda-Cyhalothrine	Karate	0,15 l	0,1 l	0,1 l	
		200 g ma/ha		Lindane Lindane huileux	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		1,5 l ou 1,5 kg		Malathion	Nombreuses spécialités (2)		1,5 l ou 1,5 kg		
		1,25 kg		Méthidathion	Ultracide 20 bouillie Ultracide 20 liquide	1,5 kg 1,5 l	1,25 kg 1,25 l		
		200 g ma/ha		Parathion Ethyl et Méthyl	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Parathion huileux	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
				Phosalone	Zolone Flo - Azofène Flo Nombreuses spécialités (2)		2 l 1000 g ma/ha	2,5 l 1200 g ma/ha	1,2 l
				Pyrimicarbe	Pirimor G - Aphox				0,5 kg
		0,75 l		Endosulfan + Parathion Ethyl	Drifène AP - Ekadrine PE	1,25 l	0,75 l		
				Endosulfan + Thiométon	Serk				1,5 l
		1 l 3 l		Lindane + Parathion Ethyl	Sopragam Typholine gamma 50	1,5 l 5 l	1 l 3 l		
		1,75 l		Lindane + Parathion Méthyl	Paralindex	2,5 l	1,75 l		
		0,75 l 0,75 l		Phosalone + Parathion Méthyl	Fortène Taxylone	1,5 l	0,75 l 0,75 l		

(1) Doses en l ou kg de produit commercial par ha.

(2) La dose de matière active par hectare mentionnée correspond à la dose de matière la plus fréquente. Avant toute utilisation, vérifier la dose de produit commercial autorisée sur l'étiquette.